

Note supplémentaire sur les Coléoptères d'Obock

Par L. FAIRMAIRE.

Séance du 23 mars 1888.

Depuis que j'ai publié dans nos *Annales* (1885, p. 435) une liste des Coléoptères recueillis à Obock par M. le capitaine Laligant, il m'a été communiqué par nos collègues, MM. A. Léveillé, L. Bedel, qui les avait reçues de MM. le D^r Faurot et F. de Beauchêne, qui les avait reçues de M. Tiercelin, lieutenant de vaisseau, un petit nombre d'espèces recueillies dans la même localité. Ce supplément est peu important, car la zone explorée est étroite et il est dangereux de pousser les recherches un peu loin.

Voici cette liste supplémentaire :

Scarites subcylindricus. — *Chlanius fulvosignatus*. — *C. seminitidus*. — *Bradybanus festivus*. — *Eunectes griseus*. — *Ateuchus cornifrons*. — *Onitis furcifer*. — *Gymnopleurus plicatulus*, n. sp. — *Stalagmosoma cynanchi*. — *Agrilus nubeculosus*, n. sp. — *Agrypnus notodonta*. — *Adesmia interrupta*. — *A. reticulata*. — *Zophosis subcostulata*. — *Ocnera angustata*. — *Oxycara hegeterica*. — *Cantharocnemus obockianus*, n. sp. — *Tithoes arabicus* Th., ♂. — *Lasiopezus rufodorsatus*, n. sp. — *Gnatholea picicornis*. — *Belodera densevestita*, n. sp. — *Dichostathes Coquereli*, n. sp. — *Galerucellu sericella*, n. sp.

J'ajoute deux Ténébrionides trouvés aux îles Camaran dans la mer Rouge et qui m'ont été communiqués par M. Aubert :

Arthrodeis lateripunctatus, n. sp. — *Adelostoma grandicolle*, n. sp.

1. *Gymnopleurus plicatulus*, n. sp. — Long. 10 à 11 mill. — *Supra cæruleus aut virescens, metallicus, nitidus, subtus metallescente-fuscus, vix nitidus, pedibus fusco-cyanescentibus aut virescentibus, antennis fuscis, clava pubescente; capite antice angustato, margine antico*

plus minusve emarginato, fortiter dense punctato, tricarinato, carinis basi fere connexis; prothorace lateribus valde rotundato, angulis posticis rotundatis, anticis acutis, dorso parum dense et sat irregulariter punctato, vitta media et postice utrinque plagula lævibus, plus minusve determinatis; elytris utrinque profunde ac late emarginatis, striato-punctatis, intervallis subtiliter ac late asperulo-punctatis, inæqualibus, alternatim paulo convexis, 2° latiore, fortiter transversim interrupto-impreso; pygidio subtiliter coriaceo, medio et lateribus carinulato; femoribus anticis subtus dente acuto armatis, tibiis crenulatis, apice sat valide tridentatis. — Obock.

Ressemble à *G. virens* Er.; en diffère par la coloration moins verte, la tête moins profondément échancrée, avec les lobes moins pointus, à carène médiane pas plus forte que les latérales, non prolongée isolément au sommet, le corselet bien moins ponctué, à plaques lisses à peine marquées, les élytres à peine ponctués avec les intervalles relevés alternativement et les fémurs antérieurs munis d'une dent aiguë.

2. **Agrilus nubeculosus**, n. sp. — Long. 9 à 10 mill. — *Parum elongatus, brunneus, paulo metallescens, pube rufa in depressionibus maculatim variegatus; capite late sulcato, sulcis lateribus ad oculos cristatim elevatis, crista antice abbreviata, punctato, rufo-cupreo piloso; antennis basi approximatis, brevibus, serratis, articulo 2° tertio parum brevioribus; prothorace longitudine duplo latiore, elytris paulo angustiore, antice paulo angulatim dilatato, aspero, antice transversim, lateribus late impresso et utrinque carina sat acuta antice medio abbreviata signato, disco medio transversim elevato et postice medio leviter impresso, margine postico utrinque valde sinuato, medio lobato-producto et truncato, lobo lævi et utrinque angulato; scutello lato, brevi, medio acuminato; elytris ad humeros rotundatis, medio utrinque sinuatis, postea vix sensim ampliatis, postice angustatis, apice obtusis et subtiliter crenulatis, dense granulato-rugosulis, basi utrinque late impressis, utrinque ante et post medium plagulis 2 impressis et plagulis minoribus numerosis sat irregularibus signatis, sutura elevata; subtus subtiliter punctato-asperulus, abdomine subtilius, parum dense griseo-pilosus, processu intercoxali lato, obtuse angulato, segmento 1° longitudinaliter leviter impresso, parte laterali superiore elytra paulo superante, dense fulvo-villosa et extus carinulata, prosterno lato, densius villosus, margine antico late arcuatim producto et intus transversim sulcato, femoribus incrassatis, tibiis 4 anticis levissime arcuatis, tarsis sat elongatis, poste-*

rioribus articulo 1° tribus ceteris conjunctis aequali, unguibus acute appendiculatis. — Obock (Laligant).

Cet Insecte, qui se trouve aussi au Sénégal, ressemble un peu à *A. venosus* Cast., mais les élytres ne sont pas aussi métalliques; ils ne sont pas sinués latéralement avant l'extrémité de manière à former une sorte de prolongement un peu divariqué; leur disque n'a pas de côte saillante; le corselet est bien moins sculpté et les crêtes juxta-oculaires sont bien plus saillantes.

3. **Cantharocnemus obockianus**, n. sp. — Long. 35 mill. — *Oblongus, valde convexus piceo-fuscus, sat nitidus, subtus cum pedibus rufo-castaneus, pectore paulo obscuriore, fulvo-villoso; capite ruguloso-punctato, summo medio subtilius et laxè punctato, medio sulcato, post oculos dense granulato, inter oculos obsolete foveolato, labro dense rufo-villoso; mandibulis capite paulo brevioribus, fortiter arcuatis, dense punctatis, apice levibus et bidentatis; antennis basin prothoracis attingentibus, rufopiceis, articulo 1° fusco, ceteris subquadratis, prothorace elytris paulo angustiore, valde transverso, lateribus subparallelis, obsolete sinuatis, postice angulatis et intus obliquatis, angulis posticis dentiformibus, anticis fere rotundatim lobatis, dorso medio parum dense punctato, intervallis subtilissime punctulatis, lateribus valde rugoso, medio postico leviter biimpresso; scutello sat brevi, obtuse angulato, vix punctato, lateribus stria marginato; elytris ad humeros rotundatim angulatis, sat dense fortiter punctatis, leviter reticulato-rugosis, utrinque lineis 2 obsolete indicatis; subtus sat subtiliter dense punctatus, abdomine lateribus impresso, prosterno lateribus plicatulo, medio fere levi, apice sat prolongato; femoribus politis, tibiis asperatis, punctatis, cxtus fortiter dentato-spinosulis.*

Ressemble à *C. spondyloides* Serv., du Sénégal, figuré par Westwood dans le vol. II du *Journal of Entomology*, pl. VII, fig. 4, mais bien plus petit; le corselet a les angles antérieurs en forme de lobe presque arrondi au lieu d'être un peu pointus, les bords latéraux forment, avant la base, un angle obtus, mais bien marqué, au lieu d'une dent saillante, et sont ensuite obliquement rétrécis vers les angles postérieurs qui sont en forme de dent courte; le bord postérieur est entier au milieu; les tibias ont en dehors quelques épines, les antérieurs en ont trois, outre la terminale qui est plus grande et plus aigüe; les antennes paraissent plus épaisses, leurs articles moins triangulaires.

4. *TITHOES ARABICUS* Thoms., *Rev. Zool.*, 1877, p. 266. — Long. 60 à 70 mill. (*cum mandib.*). — ♂. *Sat elongatus, brunneo-fuscus, nitidus, glaber*; *capite sat magno, prothorace vix angustiore, basi subtiliter dense granulato et lateribus rugoso, inter oculos medio læviore, plicatulo, et ad oculos plica majore signato, epistomate truncato, parce punctato*; *mandibulis capite haud brevioribus, crassis, apice tantum arcuatis, punctatis, supra carinatis, intus distantibus et pluridentatis*; *antennis medium corporis attingentibus, punctatis, articulo 1° brevi, crasso, 3° elongato, penultimis 4 apice angulatis, ultimo ante apicem angulato, appendiculato*; *prothorace longitudine paulo plus duplo latiore, lateribus tridentato, dentibus sat brevibus, acutis, postico brevior, dorso transversim paulo convexo, antice et basi depresso, fortiter punctato, area discoidali læviore, lateribus plicato-rugoso et utrinque plica sat brevi signato*; *scutello fere lævi, apice obtuse angulato*; *elytris ad humeros angulato-rotundatis, post medium leviter attenuatis, apice extus rotundatis, angulo suturali obtuso, basi dense rugosulo-coriaceis, rugis medio et postice obsolescentibus, linea suturali et utrinque lineis 3 anguste et breviter elevatis, postice abbreviatis, 1^a basi oblitterata*; *subtus fere lævis, pectore parce fulvo-villoso, prosterno lateribus rugoso, inter coxas bisulcato-marginato, sat fortiter arcuato*; *metasterno medio sulcato, processu intercoxali angusto, medio fere carinato*; *femoribus validis, tibiis intus fulvo-pubescentibus.*

Cet Insecte s'éloigne de ses congénères pour la coloration et l'absence de vestiture sur le dessus du corps; en outre, la saillie prosternale est assez fortement arquée, ce qui rapprocherait notre Insecte du genre *Acanthophorus*. Mais, chez ce dernier, la saillie prosternale est aiguë, comprimée, et les deux premières dents latérales du corselet sont réunies à la base, les antennes et les élytres sont bien plus longs.

Ce Prionien, trouvé d'abord à Djedda, puis dans l'Yemen, a été décrit sur une femelle qui diffère du mâle par la taille bien plus faible, les mandibules un peu moins développées et les pattes bien moins robustes. Ressemble un peu à *T. capensis*, mais plus grand, avec les élytres bien plus longs, arrondis à l'extrémité, le corselet plus inégal, les yeux un peu plus écartés et les pattes plus robustes.

La femelle a été figurée par le D^r Gestro dans les Coléoptères du voyage à Assab; elle a été trouvée à Obock par M. Tiercelin, lieutenant de vaisseau, et le mâle, qui n'était pas connu, m'a été communiqué par M. A. Lèveillé.

5. **Lasiopezus rufodorsatus**, n. sp. — Long. 16 mill. — *Oblongus, fuscus, sed pube variegata dense vestitus, griseo-cinereus, punctis et maculis fuscis sparsutus, capite summo vitta brevi transversa obtusissime angulata nigro-velutina; elytris dorso plaga media communi rufa, extus angulata et pallido marginata signatis, postice et lateralibus signaturis nigris ornatis; capite valde reclinato, medio sulcato; antennis corpore parum longioribus, ciliatis, articulis 3 primis fuscis, pallido punctatis, ceteris piceo et brunneo marmoratis, apice pallidis, articulo 1° crasso, extus apice granuloso; prothorace elytris angustiore, transversim quadrato, lateribus medio angulatim dilatatis, crenatis, dente apice obtusiusculo, dorso antice et postice transversim bisulcato et lateribus utrinque bi-marginato, disco medio tuberculo obtuso notato et arcuatim plicatulo; scutello late et obtuse triangulari; elytris ad humeros angulatis et paulo productis, basi sat acute granulatis, grosse punctatis et utrinque crista dense nigro-penicillata, extus cristula minuta comitata signatis, parte rufa æquali, dimidia parte postica carinulis penicillatis et tuberculis fuscis, ante apicem macula rufa sat minuta signatis, apice rotundatis, angulo suturali dentiformi; subtus cum pedibus griseo-pubescentibus, brunneo-punctatis, his latius fusco maculatis ♀.*

Ressemble assez à *Ancylonotus tribulus*, mais la taille est bien plus faible, le premier article des antennes est bien plus court, plus épais, avec l'extrémité garnie de granulations au lieu de cicatrice; le dessous des antennes est un peu cilié; le corselet est dilaté au milieu des côtés en une saillie crénelée avec l'extrémité un peu obtuse; la sculpture des élytres est assez semblable, mais l'extrémité est arrondie en dessous avec l'angle sutural saillant; les pattes sont plus courtes, égales, les fémurs plus épaissis au milieu, et les derniers segments abdominaux sont de longueur égale. Les mandibules sont courtes. La coloration, la forme de l'écusson, celle des épaules, des crêtes basilaires et la terminaison des élytres distingueront facilement cette espèce de *L. marmoratus* Fabr.

6. **Dichostathes Coquereli**, n. sp. — Long. 9 mill. — *Oblongus, modice convexus, postice leviter attenuatus, fuscus, pube albido-grisea dense vestitus, elytris apice paulo obscurioribus; capite medio subtiliter striato, oculis angustis fere bipartitis; antennis corpore longioribus, ciliatis, articulis apice paulo brunneis, 3° quarto longiore, ceteris gradatim decrescentibus; prothorace elytris angustiore, transverso, lateribus*

medio dente late conico armatis, dorso antice et basi transversim depresso et sulcato, disco medio dente valde obtuso infuscalo signato, utrinque obtusissime bituberoso; scutello brevi, obtuse truncato; elytris ad humeros angulatis, paulatim postice attenuatis, apice separatim rotundatis, dorso subtiliter punctatis et obsolete transversim impressiusculis, basi utrinque tuberculo brunneo compressiusculo ornatis, medio signaturis et punctis subtilibus brunneis sparsutis; subtus uniformis, pedibus validiusculis, tibiis 4 posticis extus villa fusco-pubescente ornatis. — Massonah (Coquerel).

Voisin de *D. strigifrons* Fairm., qui se trouve aussi à Obock, mais plus petit, couvert d'une pubescence plus grise et plus uniforme, avec la tête sans lignes dénudées, les yeux plus rapprochés en dessous, plus petits en dessus, le corselet ayant les dents latérales plus larges et plus coniques, et situées plus au milieu, l'écusson beaucoup plus court, les élytres atténués après le milieu, tronqués bien plus obliquement.

7. *Belodera densevestita*, n. sp. — Long. 9 à 13 mill. — *Elongata, convexa, fusca, pilis fulvo-cervinis adpressis omnino densissime vestita; capite summo brunneo breviter bilineato, inter antennis concavo; antennis corpore paulo longioribus, subtiliter ciliatis, articulo 1° sat crasso, tertio vix brevior, 3-11 subæqualibus, apice obsolete obscuratis; prothorace longitudine vix latiore, antice et basi æquilato, lateribus medio denticulo minuto signato, dorso medio transversim leviter convexo, antice leviter depresso, granulis minutissimis sparsuto; scutello apice rotundato, medio leviter sulcato; elytris elongatis, basi truncatis, ad humeros sat angulatis, postice attenuatis, apice oblique truncatis, angulo suturali late rotundato, externo sat acuto, dorso sat grosse et sat dense punctatis, leviter inæqualibus; segmento ventrali ultimo profunde ac triangulariter excavato. — Obock (D^r Faurot), coll. Bedel.*

Se trouve aussi à Guéldi (Somalis). L'individu de cette dernière localité est plus petit et d'une coloration plus roussâtre.

Cet Insecte s'éloigne un peu de ses congénères par son corps robuste, assez épais et recouvert d'une pubescence extrêmement serrée, cachant complètement la couleur du fond, et presque uniforme, étant seulement un peu plus claire sur le disque du corselet et formant sur les élytres des taches extrêmement indistinctes, paraissant très légèrement impressionnées.

8. *Galerucella sericella*, n. sp. — Long. 6 mill. — Oblongo-subovata, sat convexa, supra nitida, subtiliter griseo-sericans, capite flavido-testaceo, vertice plus minusve infuscato, prothorace maculis 3 nigris transversim dispositis, scutello fusco, elytris umbrino-æneis, margine externo paulo virescentibus, densissime griseo sericantibus, antennis, pectore pedibusque flavido-testaceis, abdomine infuscato; capite subtiliter ruguloso-punctato, vertice medio sulcatulo; antennis parum gracilibus, articulo 1° arcuato, 2° tertio paulo brevior, 3° quarto dimidio brevior, hoc sequente longior; prothorace longitudine plus duplo latiore, elytris angustiore, lateribus rotundatis, basi oblique truncatis, dorso dense subtiliter rugosulo-punctato, medio transversim impresso, basi medio obsolete elevato; scutello subtilissime punctato, apice obtuso; elytris ad humeros rotundatim angulatis, callo humerali sat convexo, subtilissime densissime coriaceis, apice separatim rotundatis; subtus subtiliter coriacea, griseo-sericans. — Obock (Laligant).

Ressemble assez à *G. xanthomelæna*, mais la coloration des élytres est bien différente, d'un bronzé cuivreux peu foncé, voilé par une pubescence grise serrée et paraissant plus foncée sur les côtés avec une très étroite bordure d'un vert métallique.

9. *Arthrodeis lateripunctatus*, n. sp. — Long. 7 mill. — Sat breviter ovatus, valde convexus, niger, sat nitidus; capite subtiliter dense punctato, antice dense sat subtiliter punctato-rugoso, clypeo antice late leviter sinuato, labro indistincto, rufo-piloso, mandibulis ante apicem supra dentatis, oculis fere occultis, antennis sat crassis, cylindricis, basi piceis, articulo ultimo paulo latiore; prothorace amplo, elytris haud angustiore, longitudine duplo latiore, lateribus fere parallelis, ad angulos anteriores rotundatis, margine postico medio obtusissime angulato, utrinque late leviter sinuato, dorso subtilissime parce punctulato, lateribus densius ac fortius punctato; elytris brevibus, cuneatis, a basi angustatis, obsolete plicatulis et subtilissime parce punctatis, ad scutelli locum transversim sulcatis; pedibus anticis validis, tibiis valde bidentatis, dente supero minore, magis acuto, terminali majore, parum acuto. — Iles Camaran.

Cette espèce est remarquable par l'ampleur du corselet que fait ressortir la brièveté et la forme en coin des élytres; ces derniers présentent de très faibles plis, et les côtés du corselet sont assez densément ponc-

tués. Le faciès de cet Insecte fait penser au genre *Histeromorphus*, mais ce dernier doit être plus déprimé et les caractères du labre et des mandibules ne conviennent pas.

10. *Adelostoma grandicolle*, n. sp. — Long. 6 mill. — *Oblongum, fusco-nigrum, subopacum; capite transversim subquadrato, antice fere truncato, punctato-ruguloso, vertice breviter bicostato, clypeo medio breviter antice carinato, costis juxta-oculariis elevatis; antennis crassis, basin prothoracis attingentibus; prothorace transverso, medio elytris haud angustiore, antice leviter angustato, postice constricto, lateribus denticulatis, paulo explanatis et picescentibus, postice oblique sinuatis, angulis posticis rectis, dorso dense punctato-asperato, medio costis 2 parum acutis sat approximatis, parallelis signato; elytris ovato-oblongis, grosse aspero-granulatis, sutura elevata, utrinque costis 2 sat acutis, basi leviter intus arcuatis, apice coeuntibus, margine externo carinato.* — Iles Camaran.

Voisin de *A. abyssinicum*, mais plus grand, avec le corselet bien plus large, aplani sur les côtés, les élytres à suture plus saillante, et la tête à carène clypéale tout à fait antérieure et très courte. *A. bicarinatum* Waterh., de Socotora, en diffère par les élytres ayant chacun trois carènes, la deuxième raccourcie à la base et à l'extrémité.

